



## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

**Ацербин**

**Регистрационный номер:** П N014168/01

**Торговое название:** Ацербин

**Лекарственная форма:**

Раствор для наружного применения

**Состав:**

100 г содержат:

активные вещества: DL – яблочная кислота – 2,153 г; бензойная кислота – 0,154 г; салициловая кислота - 0,041 г;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль- 39,439 г, очищенная вода – 58,213 г.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептическое средство.

**Код АТХ:** [D08A]

**Фармакологическое действие:**

Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.

**Показания к применению**

При комплексном лечении поверхностных ожогов кожи, длительно незаживающих ран, трофических язв и пролежней.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Возможно применение препарата во время беременности и кормления грудью.

**Способ применения и дозы**

Наружно, после хирургической обработки ран и ожогов раствор наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или раствор наносят на перевязочный материал, а затем на рану 2-3 раза в день. После начала эпителизации наносить 1 раз в день.

В случае отсутствия аллергических реакций лечение может продолжаться до полного заживления раны или ожога.

**Побочное действие**

Жжение в месте нанесения, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата. Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка:**

Случаев передозировки не выявлено.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Салициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, нанесёнными на ту же область.

### **Особые указания:**

Избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз.

Если применение препарата не даёт ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу.

При ожогах с большой площадью поражения лечение должно производиться только под наблюдением врача.

### **Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Не влияет.

### **Форма выпуска**

По 80 мл в пластиковый флакон с распыляющей насадкой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

По 1000 мл в пластиковую бутылку. По 50 бутылей вместе с равным количеством инструкций упаковывают в транспортную тару. Бутылки по 1000 мл предназначены для стационара.

### **Срок годности**

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Специальные меры предосторожности при утилизации неиспользованного препарата**

Не требуются.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в местах недоступных для детей.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.

### **Предприятие-производитель**

Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х., 6067 Австрия, Абзам, Зальцбергштрассе 96.

### **Претензии потребителей направлять по адресу:**

Представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»,

Адрес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д.22, стр. 3.

Тел./ факс 8 (495) 781 71 08.

